

A la fecha no hay evidencia de transmisión de COVID 19 de Madre a Hijo durante el embarazo. Sin embargo una vez ha nacido el bebé, se debe seguir las recomendaciones de higiene y protección, para evitar contagios.

NUMERO DE CASOS POSITIVOS NOTIFICADOS DE COVID 19 EN GESTANTES, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO – SEPTIEMBRE 2020.



148 casos POSITIVOS en seguimiento para COVID 19

130 casos RECUPERADOS de COVID 19

EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2016 SE PRESENTARON CERCA DE 326 MUERTES MATERNAS TEMPRANAS, con una razón de mortalidad materna preliminar de 49,3 casos por cada 100.000 nacidos vivos.

Los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas son las principales causas de mortalidad en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

CASOS QUE RESIDEN EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO – SEPTIEMBRE 2020.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA

2020

1335 CASOS

7 CASOS



ALERTA DISTRITAL POR MORTALIDAD MATERNA

El **día del parto** puede ser de alto riesgo para la vida de la madre y/o del bebé.



La tasa de mortalidad perinatal disminuyó en Colombia de 24 por mil, en 2000, a 17 por mil, en 2005, y a 14 por mil, en 2010

NUMERO DE CASOS PRESENTADOS DE MORTALIDAD PERINATAL, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO - SEPTIEMBRE 2020.



Mortalidad Perinatal
253 casos

Las ITS afectan aspectos tan importantes como salud Materna y salud perinatal, al igual que la Calidad de vida y la Sexualidad.

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO – SEPTIEMBRE 2020.



267 casos de Sífilis Gestacional 2020

74 casos de Sífilis Congénita 2020

3 Casos de gestantes con Hepatitis B 2020

9 casos de gestantes con VIH 2020